



**BUDAPESTI PÉTERFY SÁNDOR UTCAI  
KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET**

✉: 1076 BUDAPEST, PÉTERFY SÁNDOR UTCA 8-20

☎: 06-1-461-4700

@: PETERFY@PETERFYKH.HU



## Beleegyző nyilatkozat akut stroke thrombolyticus kezeléséhez

Alulírott .....(név).....(szül. idő) tanúsítom, hogy engem  
dr. ....felvilágosított az alábbiakról: ...

Az Önt vagy Hozzá tartozóját ért agyi keringészavar (ischaemiás stroke) lényege, hogy az agyat ellátó érrendszer egy pontján vérrög keletkezett, vagy a szervezetben máshol kialakult rög az agyi érrendszerben elakadt, így az agy egy részének vérellátása megszűnt. Az idegsejtek nagyon érzékenyek a vérellátás csökkenésére vagy megszűnésére, ezért már néhány óra alatt visszafordíthatatlanul károsodhatnak, és az így kialakuló tünetek (végtaggyengesség, bénulás, beszédzavar) általában tartósak, csak hetek-hónapok alatt javulhatnak.

A kutatási eredmények és a klinikai vizsgálatok szerint, ha a vérrög 3 órán belül feloldódik, és a keringés újra megindul, akkor a károsodás mértéke, illetve a károsodott terület mérete lényegesen kisebb lehet. Erre irányul a szisztémás thrombolysis, melynek lényege, hogy egy perifériás vénán keresztül a keringésbe vérrögoldó anyagot (thrombolyticum, fibrinolyticum) juttatunk 1 órán keresztül abból a célból, hogy az agyi eret elzáró rögöt feloldjuk.

1. Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy a betegségem további megfelelő kezeléséhez szisztémás thrombolyticus kezelés szükséges.

2. A kezelés menete: A beavatkozást megelőzően két perifériás vénát biztosítunk, és a kezelés elvégezhetőségének megítéléséhez a szükséges laborvizsgálatokat elvégezzük. Amennyiben a kezelésnek ellenjavallata nem áll fenn, testtömegre számított dózisú vérrögoldó szert (r-tPA) fecskendezünk az egyik kanülbe oly módon, hogy a kiszámított mennyiség 10% -át gyorsan – bolus formájában – a maradékot pedig 1 óra adjuk be. A kezelés alatt EKG-monitorozást, és 5 percnként vérnyomásmérést végzünk.

3. A kezelés kockázata abból adódik, hogy a bejuttatott vérrögoldó szer az egész érrendszerben eloszlik, és átmenetileg vérzékenységet okozhat bárhol a szervezetben, valamint vérzéscsen át alakulhat az agyi infarktus területe is. A vonatkozó szabályok – thrombolysis-protokoll - betartásával, az állandó felügyelettel és észleléssel ezen szövődmények kockázatának csökkentésére törekszünk.

Amennyiben a kezelést elutasítom, úgy a beavatkozás elmaradásából származó esetleges következményekért a felelősséget vállalom.

Kérdéseimre részletes, érthető, kielégítő választ kaptam, az tájékozott beleegyezéshez kellő idő állt rendelkezésemre.

Szóbeli felvilágosítás és a fentiek figyelembevételével a szisztémás thrombolyticus kezelésbe.

Beleegyzem \*

Nem egyezem bele\*

Kelt: Budapest, 20.....

.....  
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

(rokonsági fok: .....)

.....  
az orvos aláírása

Tanúk:

1. Név: .....

2. Név: .....

Cím: .....

Cím: .....